Energiehaushalte des Erdsystems auf globaler und regionaler Skala

Michael Mayer

Leo Haimberger

Marianne Pietschnig

Sebastian Stichelberger

FWF

Der Wissenschaftsfonds.

Global gemittelter Energiehaushalt

- ASR und OLR balancieren sich im globalen Mittel
- Global gemittelter Oberflächenfluss klein (nahe 0)
- Diese Darstellung liefert keinerlei räumliche Information!

← Top-of-atmosphere (TOA)
Sum at TOA ≈ 0

← Sum at surface ≈ 0

Fig. From Trenberth et al. 2009

Global gemittelter Energiehaushalt

- ASR und OLR balancieren sich im globalen Mittel
- Global gemittelter Oberflächenfluss nahe 0
- Diese Darstellung liefert keinerlei räumliche Information!

0.84 W m^{-2} (Balmaseda et al. 2013)

Fig. From Trenberth et al. 2009

Global gemittelter Energiehaushalt

- ASR und OLR balancieren sich im globalen Mittel
- Global gemittelter Oberflächenfluss nahe 0
- Diese Darstellung liefert keinerlei räumliche Information!

0.84 W m^{-2} (Balmaseda et al. 2013)

0.9 W m^{-2} (Trenberth et al. 2016)

Fig. From Trenberth et al. 2009

Global gemittelter Energiehaushalt

- ASR und OLR balancieren sich im globalen Mittel
- Global gemittelter Oberflächenfluss nahe 0
- Diese Darstellung liefert keinerlei räumliche Information!

0.84 Wm⁻² (Balmaseda et al. 2013)

0.9 Wm⁻² (Trenberth et al. 2016)

0.65 Wm⁻² (Llovel et al. 2014)

Fig. From Trenberth et al. 2009

Zonal gemittelter Energiehaushalt

- Lokale energetische Imbalance zwischen Oberrand und Oberfläche bedingen lateralen Energietransport
- Wie stark sind diese Transporte? Wie stark variieren sie? Trends?

Boxhaushalt

Datenquellen

- **Atmosphäre**
 - Strahlung: Satellitendaten (CERES)
 - Energietransporte: Atm. Reanalysen (ERA-Interim, JRA-55,...)
- **Ozean**
 - Wärmetransport und –speicherung: Ozeanreanalysen (C-GLORSv5, ORAS4, ORAP5, ORAS5), in-situ-Messungen
- **Meereis**
 - Eisausdehnung: Satellitendaten (NSIDC, OSI-SAF)
 - Eisvolumen: Ozean-/Meereisreanalysen (C-GLORSv5, ORAS5, PIOMAS)

Datenquellen

- **Atmosphäre**
 - Strahlung: Satellitendaten (CERES)
 - Energietransporte: **Atm. Reanalysen** (ERA-Interim, JRA-55,...)
- **Ozean**
 - Wärmetransport und –speicherung: **Ozeanreanalysen** (C-GLORSv5, ORAS4, ORAP5, ORAS5), in-situ-Messungen
- **Meereis**
 - Eisausdehnung: Satellitendaten (NSIDC, OSI-SAF)
 - Eisvolumen: **Ozean-/Meereisreanalysen** (C-GLORSv5, ORAS5, PIOMAS)

→ **Reanalysen sind wichtige Datenquellen für alle Klimasubsysteme**

Anwendung I: El Niño – Southern Oscillation (ENSO)

Tropischer Energiehaushalt während ENSO

- Balance zwischen atm. Horizontaltransport und ozeanischer Speicherung

Mayer et al. (2014)

Regressionsanalyse für alle Ozeanbecken

- In allen Ozeanbecken Balance vorwiegend zwischen $DIVFA$, Rad_{TOA} und $OHCT$
- Gute Übereinstimmung verschiedener Datensätze
- Unsicherheit im Indik am größten
- Unsicherheiten akkumulieren im zonalen Mittel

Mayer et al. (2014)

ENSO in CMIP5-Modellen

- OHCT in **oberen 300m** vs N3.4 okay in 50% der Modelle
 - OHCT in **oberen 700m** vs N3.4 von Modellen deutlich unterschätzt
 - CMIP5-Modelle verteilen die Energie eher um als sie an die Atmosphäre abzugeben
- Wie realistisch sind regionale Variabilität und Trends von OHC in Klimamodellen?

Mayer et al. (2016)

Anwendung II: Klimawandel in der Arktis

Rezente Trends auf jährlicher Basis

- Akkumulierte Energie der arktischen Polkappe (70N-90N)

- Starker Aufwärtstrend in OHC
- in-situ basierter OHC (Hadley EN4) sehr “wackelig”
- Vergleichsweise wenig Energie wird für Eisschmelze verwendet

Rezente Trends auf jährlicher Basis

- Akkumulierte Energie der arktischen Polkappe (70N-90N)

- Starker Aufwärtstrend in OHC
- in-situ basierter OHC (Hadley EN4) sehr “wackelig”
- Vergleichsweise wenig Energie wird für Eisschmelze verwendet
- Energieakkumulation entspricht $\sim 0.7 \text{ Wm}^{-2}$ → nahe dem global Mittel!
→ “Arctic amplification” nur ein Oberflächenphänomen?

Mayer et al. (2016)

Saisonale Trends 2000/03 – 2015/02

- Klare Trends in Strahlung, atmosphärischen Transporten, ozeanischer Wärmespeicherung → Amplifizierung des Jahresganges

Zusammenfassung

- Haushaltsdiagnostiken helfen, das Klima zu quantifizieren
 - Wie groß ist die energetische Imbalanz des Klimasystems?
 - Wie viel Energie verliert der Pazifik während El Nino? Was passiert mit ihr in der Folge?
 - Akkumuliert Energie in der Arktis schneller als in anderen Regionen?
- Haushaltsdiagnostiken helfen, Datensätze zu validieren
 - Wie gut reproduzieren Klimamodelle beobachtete Energieflüsse?
 - Zeitliche Homogenität, Konsistenz zwischen Reanalysen

Saisonale Trends im arktischen Ozean (70N-90N) 2000-2014

- Relativ gute Übereinstimmung der Trends im Herbst
- Hadley EN4 zeigt keine Trends im Frühling, weil Beobachtungen fehlen!

Seasonal OHC300 trends (70-90N)

Yearly cycle of observations in Hadley EN4 —nr of profiles